

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از نور و رطوبت محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

صاحب امتیاز و پرونانه: شرکت ایران دارو
تولید شده در شرکت داروسازی ایران دارو
منبع:

BNF-84

مشخصات: کرنویت ۷۵ میلی گرم، به صورت کپسول زرشکی رنگ می باشد. هر کپسول از کرنویت حاوی ۷۵ میلی گرم عصاره میوه کرنبری (معادل ۳۲/۵ میلی گرم پروآنتوسیانیدین) و ۱۰۰ میلی گرم ویتامین ث به عنوان ماده موثره می باشد و به صورت خوراکی قابل استفاده است.

اندازه هر سهم: ۱ کپسول	تعداد سهم در بسته بندی: ۳۰
ماده موثره	مقدار در هر سهم
عصاره میوه کرنبری (Highbush blueberry) (Vaccinium macrocarpon L.) میلی ۳۲٫۵ میلی گرم پروآنتوسیانیدین	۷۵ میلی گرم
ویتامین ث	۱۰۰ میلی گرم
درصد ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی ۲۰۰ کالری است	۱۱۱%
مواد جانبی: تالک، میکروکریستالین سلولز	

دسته بندی: فرآورده های طبیعی

موارد مصرف: کمک به پیشگیری از عفونت ادراری راجعه در زنان

خواص عملکردی: کرنبری یکی از بهترین منابع آنتی اکسیدان است. این میوه حاوی مجموعه ای از انواع آنتی اکسیدان ها می باشد که از سلول های بدن در مقابل آسیب ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کرده و در جلوگیری از بروز بیماری های مزمن مفید است.

موارد منع مصرف: مانند همه داروها، کرنویت نیز نباید در برخی شرایط استفاده شود. که عبارتند از:
• حساسیت به میوه کرنبری
• حساسیت به هریک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده

بارداری و شیردهی: اگر باردار هستید، به کودک خود شیر می دهید یا می خواهید باردار شوید، پزشک یا داروساز خود را در جریان بگذارید و توصیه های لازم را دریافت کنید. مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد.

موارد هشدار و احتیاط: پیش از مصرف کرنویت، در خصوص موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید:
• داشتن سابقه حساسیت به هر یک از اجزای این فرآورده
• داشتن سابقه سنگ کلیه

تداخلات دارویی: اگر داروی دیگری مصرف می کنید، (که شامل داروهای بدون نسخه هم می شود)، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این امر در رابطه با داروهای زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
داروهای ضد تجمع پلاکت و رقیق کننده خون همانند کابوپیدگرویل، وارفارین و آسپرین، آتورواستاتین، نیفدیپین

مقدار و نحوه مصرف: همیشه دارو را دقیقاً به نوبی که پزشک برای تان تجویز کرده است استفاده کنید.
بالغین:
روزانه یک عدد حداقل به مدت ۴ هفته مصرف نمایید.

عوارض جانبی: مانند همه داروها، کرنویت می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، هرچند که در همه افراد به طور یکسان بروز نمی یابد. عوارضی که ممکن است با مصرف کرنویت بروز کند، عبارتند از:
تاریحتی معده و اسهال

