

بروملین

تداخلات دارویی:

اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید (که شامل داروهای بدون نسخه هم می‌شود)، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این امر در رابطه با داروهای زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

– داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین سدیم

– آنتی بیوتیک‌های دسته‌تتراسایکلین‌ها مانند داکسی‌سایکلین

مقدار و نحوه مصرف:

همیشه این محصول را دقیقاً به نحوی که پزشک برایتان تجویز کرده است استفاده کنید. با این حال مصرف معمول این فرآورده به شکل زیر است:
بالغین: ۱ کپسول، سه بار در روز قبل از غذا مصرف شود.

عوارض جانبی:

مانند همه داروها، بروملین نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، هرچند که در همه افراد به طور یکسان بروز نمی‌یابد. عوارضی که ممکن است با مصرف بروملین بروز کند، عبارتند از:
علائم گوارشی از جمله تهوع، استفراغ و اسهال.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرده، و از نور و رطوبت محافظت نمایید.
دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

صاحب امتیاز و پراونه: شرکت ایران دارو
تولید شده در شرکت داروسازی ایران دارو

منبع:

Natural medicines

مشخصات فرآورده:

بروملین به صورت کپسول می‌باشد. هر کپسول از بروملین، حاوی GDU ۵۰۰ بروملین به عنوان ماده مؤثره می‌باشد و به صورت خوراکی قابل استفاده است.

اندازه هر سهم: ۳ کپسول	تعداد سهم در بسته بندی: ۱۰ عدد
ماده مؤثره	مقدار در هر سهم
بروملین	(۵۰۰ میلی گرم) GDU ۵۰۰
مواد جانبی: لاکتوز مونوهیدرات، میکروکریستالین سلولز، تالک	

دسته بندی:

فرآورده های طبیعی

موارد مصرف:

ضد التهاب

خواص عملکردی:

بروملین قریبی است که مولکول های پروتئین را تجزیه می کند و از ساقه آتانس به دست می آید. آرمایشات نشان می دهد بروملین از لخته شدن خون جلوگیری می کند و التهاب را کاهش می دهد. بروملین می تواند تورم، حساسیت و درد را در هنگام آسیب به سیستم اسکلتی عضلانی کاهش دهد. بروملین همچنین می تواند تورم و ادم بعد از عمل را کاهش داده و در صورت مصرف قبل از جراحی، منجر به کاهش مدت زمان مداوم درد و التهاب شود.

موارد منع مصرف:

مانند همه داروها و مکمل ها، بروملین نیز نباید در برخی شرایط استفاده شود. که عبارتند از:

• حساسیت به ماده بروملین، آتانس یا هر یک از مواد تشکیل دهنده این کپسول

بارداری و شیردهی:

اگر باردار هستید، می خواهید باردار شوید و یا به کودک خود شیر می دهید، پزشک یا داروساز خود را در جریان بگذارید و توصیه های لازم را دریافت کنید.

بارداری و شیردهی: به دلیل ثابت نشدن ایمنی این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی، استفاده از آن توصیه نمی شود.

موارد هشدار و احتیاط:

قبل از مصرف بروملین در خصوص موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

• ابتلا به زخم / ضایعات گوارشی

• داشتن سابقه لخته شدن خون، اختلالات خونریزی دهنده