

ویتامین ث ۵۰۰ میلی گرم

عوارض جانبی: عوارض همه داروها، ویتامین ث می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، هرچند که در همه افراد به طور یکسان بروز نمی یابد. عوارضی که ممکن است با مصرف ویتامین ث بروز کند، عبارتند از: اسهال، اختلال گوارشی، هپراگزالوری، پلوری.

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از نور و رطوبت محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

صاحب امتیاز و پروانه: شرکت ایران دارو تولید شده در شرکت داروسازی ایران دارو منبع:

BNF-8401

مشخصات مکمل: ویتامین ث ۵۰۰ میلی گرم به صورت قرص جویدنی با طعم پرتقال یا تمشک می باشد. هر یک عدد از قرص ویتامین ث حاوی ۵۰۰ میلی گرم ویتامین ث به عنوان ماده موثره می باشد و به صورت خوراک قابل استفاده است.

اندازه هر سیم: ۱ قرص	تعداد سیم در بسته بندی: ۳۰
ماده موثره	مقدار در هر سیم
ویتامین ث	۵۰۰ میلی گرم
درصد ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری است.	
مواد جانبی: پلی وینیل پیرولیدون، سوکرالوز، لکتوز، منیزیم استئرات، اسانس پرتقال، تمشک، سیلیکون دی اکساید	

دسته بندی: مکمل

موارد مصرف: قرص جویدنی ویتامین ث جهت کمک به عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و تامین ویتامین ث مورد نیاز بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص عملکردی: ویتامین ث (همچنین به عنوان اسید اسکوربیک و آسکوربات شناخته می شود) یک ویتامین محلول در آب است که در مرکبات و سایر میوه ها، انواع توت ها و سبزیجات یافت می شود. برای پیشگیری و درمان اسکوربوت، بیماری ناشی از کمبود ویتامین ث استفاده می شود. ویتامین ث یک ماده مغذی ضروری است که در ترمیم بافت، تشکیل کلاژن و تولید انتقال دهنده های عصبی نقش دارد. برای عملکرد چندین آنزیم و برای عملکرد سیستم ایمنی مهم است. همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند.

موارد منع مصرف: مانند همه داروها و مکمل ها، ویتامین ث نیز نباید در برخی شرایط استفاده شود. که عبارتند از:

- حساسیت به هر یک از اجزا تشکیل دهنده این فرآورده
- ابتلا به هایپر اگزالوری

بارداری و شیردهی: اگر باردار هستید، قصد باردار شدن دارید یا به کودک خود شیر می دهید، پزشک یا داروساز خود را در جریان بگذارید و توصیه های لازم را دریافت کنید.

موارد هشدار و احتیاط: این فرآورده مکمل بوده و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی باشد. پیش از مصرف ویتامین ث، در خصوص موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

- داشتن سابقه حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده.

تداخلات دارویی: اگر داروی دیگری مصرف می کنید، (که شامل داروهای بدون نسخه هم می شود)، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این امر در رابطه با داروهای زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

دفر وکسامین، ایندیناویر

مقدار و نحوه مصرف: همیشه دارو را دقیقاً به نحوی که پزشک برایتان تجویز کرده است استفاده کنید. **نیز گسالان:** روزانه یک عدد قرص جویده شود.